

Taifun® B

Taimkaitsevahend

Herbitsiid

Toimeaine: glüfosaat 360 g/l

Preparaadi vorm: vesilahus

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaade uuendamisel, ümberküntavatel põldheinapõldudel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, puuvilja- ja marjaaedade reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsanduses, koristuseelseks umbrohutõrjeks teraviljal, rapsil ja linal ning ristiku-, lutserni-, rapsi- ja linapõldudel võrmi kollete hävitamiseks.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede dreanaažide).

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Pakend: 100 ml

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

Kasutuspiirang: keelatud kasutada saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks.

Taimkaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Eesti reg-nr: 0047/04.01.06

Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil

Registreeringu hoidja: ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Madalmaad

Tel.: +31 33 4453160

www.adama.com

Tootja: ADAMA Deutschland GmbH,

Edmund-Rumpler-Str. 6,

D-51149 Köln, Germany

Pakendaja: UAB Inovacine firma „MKDS“

Piliakalnio 68. Nemencine, Vilnius r. Sav. LT-15175

Eestise toimetaja ja turustaja: Holding Invest OÜ Reg.nr 11174105

tel: +372 56294071 e-mail: hi@hi.ee www.hi.ee

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet!

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

Keskkonnaohtlikus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Ettevaatusabinõud: Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest.

Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Taara kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Esmaabi: Sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte.

Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

Toime iseloomustus: Taifun® B on üldhävitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt 3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei sajak vähemalt 6 tundi jooksul vihma.

Töölahuse valmistamine: Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja.

Pritsi puhastamine: Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast, jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.

KASUTAMINE:

Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel

Mitte töödelda seemnevilja põlde. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel peab olema vähemalt 10 päeva. Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30% (terale jääb põidlaküüne jälg, kuid teda on raske küünega poolitada).

Kulunorm: orashein jt. pikaalised umbrohud 3-4 l/ha, 300-400 ml/1000m², 30-40 ml/100m². Vahetult pärast koristamist võib põldu harida.

Koristuseelne umbrohutõrje rapsil ja linal

Rapsi pritsitakse 14-21 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus peab olema alla 30%. Lina pritsitakse 14 päeva enne koristust.

Kulunorm: orashein jt. pikaalised umbrohud 3-4 l/ha, 300-400 ml/1000m², 30-40 ml/100m².

Kõrrepõld

Teravilja koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist **EI TOHI** põldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-5 pärislehte. Põldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist.

Kulunorm: orashein jt kõrrelised umbrohud 3-4 l/ha, 300-400 ml/1000m², 30-40 ml/100m².

Pikaalised umbrohud 4-5 l/ha, 400-500 ml/1000m², 40-50 ml/100m². Pritsida võib ka hilissügisel, öökülm kuni -3°C ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

Rohumaade uuendamine

Taimed peavad olema heas kasvuhoo ja vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni, välja arvatud ajal kui pritsitaval alal on õitsvaid taimi. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub **Taifun® B** kõige tõhusamalt enne õitsemist.

Kulunorm: orashein jt kõrrelised umbrohud 4 l/ha, 400 ml/1000m², 40 ml/100m².

Teised raskesti tõrjutavad kõrrelised ja mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud 5-7 l/ha, 500-700 ml/1000m², 50-70 ml/100m².

Kesad

Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.

Kulunorm: Pikaalised umbrohud 2-6 l/ha, 200-600 ml/1000m², 20-60 ml/100m².

Ristik, lutsern, lina

Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.

Kulunorm: 7-8 l/ha, 700-800 ml/1000m², 70-80 ml/100m².

Ümberkännile minevad põldheinapõllud

Pritsitakse 1-3 nädalat pärast heina koristust, kui põldhein ja umbrohud on uuesti kasvama hakanud.

Kulunorm: 4-5 l/ha, 400-500 ml/1000m², 40-50 ml/100m².

Viljapuu- ja marjaaedade reavahed

Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoo (10-30 cm kõrgune). **JÄLGI HOOLEGA**, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. **ÄRA PRITSI** tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: Kaheidulehelised ja kõrrelised umbrohud 3-5 l/ha, 300-500 ml/1000m², 30-50 ml/100m².

Vee kulu 200-300 l/ha, 20-30 l/1000 m², 2-3 l/100 m².

Kändude töötlemine

Taifun® B hoiab ära uute kasvude tekke maha saetud puude kändudel. 20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib preparaat kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on samaliigiline puu, mida tahad säilitada.

Metsataimlate kesaosakond

Pikaaliste umbrohtude tõrjeks.

Kulunorm: 6-8 l/ha, 600-800 ml/1000m², 60-80 ml/100m². Pritsitakse juunist augustini.

Mittepõllumajanduslikud alad

Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal, välja arvatud ajal kui pritsitaval alal on õitsvaid taimi. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.

Kulunorm: normaalne umbrohtumus 2-4 l/ha, 200-400 ml/1000m², 20-40 ml/100m².

Mitmeaastased raskesti tõrjutavad umbrohud 4-8 l/ha, 400-800 ml/1000m², 40-80 ml/100m².

Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata. Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitatav kasutada selgpritsi.

Kulunorm: 200-300 ml **Taifun® B** segada 10-15 l veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m² pritsimiseks.

Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.