


BIOTEHNILISED MEETODID

PÜÜNISKÄRG

- Mesilasema asetatakse isolaatorisse koos ülesehitatud kärjega, milles ei ole hauet olnud.
- 7-9 päeva pärast asendatakse isolaatoris olev kärj uuega. Vana raam pannakse isolaatori taha. Emakupud eemaldatakse.
- Järgmise 7-9 päeva pärast pannakse jälle uus püüniskärj. Esimene, milles on kaanetatud haue, eemaldatakse tarust ja hävitatakse. Isolaatoris olev püüniskärj pannakse selle asemele.
- Järgmise 7-9 päeva pärast eemaldatakse väljatõstetud püüniskärj taas. Mesilasema lastakse vabaks. Püüniskärj jääb isolaatorisse. Viimane eemaldatakse nädala pärast.



EMA ISOLEERIMISE MEETOD

- 24 päeva enne viimast meevõtmist mesilasema puuristatakse.
- 24 päeva pärast avatakse puur, et ema saaks ise välja minna.
- Mesi võetakse välja.
- Sellele haudmeta mesilasperele saab nüüd teha oblikhappetõrjet.

HAUDME TÄIELIK EEMALDAMINE

- Ainult tugeva tabandumise korral.
- Hiljemalt juuli keskel ja pärast viimast meevõttu eemaldatakse kogu kaanetatud haue.
- Tehakse oblikhappetõrjet. Kuna mesilased on kärgedel rohkem hajutatult, kasutada 6 ml (Eesti) või 5 ml (Langstroth) oblikhapet kärjetänava kohta.

