

# Dialyt

Dieetsööt- vasikatele, sigadele, lammastele, kitsetalledele ja varssadele.

Stabiliseerimaks vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu toetamaks vasikate, põrsaste, lamba-ja kitsetallede ning varssade seedimist.

## Toote kirjeldus:

1. Dialyt on meeldiva välimusega valge pulber, mis lahustub hästi vees.
2. Dialyt sisaldab järgmisi elektrolüüte: naatrium, kloor, kaalium ja bikarbonaat, mis on segatud dekstroosi hulka.  
*Elektrolüüdid mõjutavad vedeliku tasakaalu seedimisprobleemide puhul.  
- Dekstroos on hõlpsasti imenduv energia.*
3. Vitamiinilisand.  
*Loomad saavad kõiki olulisi vitamiine sisaldavat väärtuslikku lisandit.*

---

Koostis: Dekstroos\*\*, Naatriumvesinikkarbonaat, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Luctarom <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Aine maitse ja söödavuse parendamiseks  
\*\* Süsivesikute allikas

Analüüs:	Lisaained (kg kohta):
18,0 % Toortuhk	100,000.00 I.U. Vitamiin A (3a672a)
0.0 % Kaltsium	10,000.00 I.U. Vitamiin D3 E671)
4.4 % Naatrium	273.00 mg Vitamiin E (3a700) <i>all rac alfa tokopherolacetate</i> (300.00 I.U)
1,8% Kaalium	40.00 mg Vitamiin B1 (3a821)
4,4% Kloriid	80.00 mg Vitamiin B2
0,8% Süsivesikud	60.00 mg Vitamiin B6 (3a831)
0,1% Naatriumvesinikkarbonaat	0.20 mg Vitamiin B12
	300.00 mg D-pantoteenhape
	600.00 mg Nikotiinhape (3a314)
	30.00 mg Foolhape (3a316)
	4.00 mg Biotiin (3a880)
	500.00 mg Koliinkloriid(3a890)
	3,000.00 mg Vitamiin C (3a300)

Seda ühendit tohib kasutada ainult 200 g ulatuses päevasest söödast.

---

## Kasutusjuhend:

Me soovitame küsida nõu veterinaarilt enne kasutamist või kasutusperioodi pikendamisel.

Samaaegset piimaga toitmist tuleks seedehäiretega loomade puhul vältida.

1 portsjon koosneb 100 g Dialytist, mis on lahustatud 2 l vees (40–50 °C). Piima ja Dialyti tuleb anda eraldi, intervalliga vähemalt pool tundi.

Kui on olemas seedehäirete oht ja seedehäirete (kõhulahtisuse) perioodidel:

1. 1 portsjon koosneb 100 g Dialytist, mis on lahustatud 2 l vees (40–50 °C).
  2. Dialyti on kasulik anda esimese paari päeva jooksul pärast loomade viimist teise kohta
-

## Dialyt vasikatele

1. Loomade viimine teise kohta.  
*1. päev:* pool piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust poole tunni pärast.  
Seejärel terve piimaratsioon ja Dialyti lahust mitte anda.
2. Ennetav lisand.  
*1. päev:* pool piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust poole tunni pärast.  
*2. päev:* kolm neljandikku piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust poole tunni pärast.  
*3. päev:* terve piimaratsioon ja Dialyti lahust mitte anda.
3. Kõhulahtisuse korral.  
*1. päev:* piim – või pool kolostrumist – asendatakse Dialyti lahusega ja antakse soovitud kogused (4 portsjonit jagatakse 2–4 ratsiooniks).  
*2. päev:* pool piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust poole tunni pärast.  
*3. päev:* kolm neljandikku piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust poole tunni pärast.  
*4. päev:* terve piimaratsioon ja Dialyti lahust mitte anda.

## Dialyt põrsastele:

1. Loomade viimine teise kohta.  
*1. päev:* Dialyti lahust antakse soovitud kogus.  
*2. päev:* 2 portsjonit Dialyti lahust pesakonna kohta.  
*3. päev:* Dialyti lahust ei anta.
2. Ennetav lisand.  
1–2 portsjonit Dialyti lahust pesakonna kohta.
3. Kõhulahtisuse korral.  
Dialyti lahust antakse soovitud kogus.

Dialyt naaritsatele 100 g 2 liitri vee kohta

---

**Parim enne:**

Vt toote pakendilt  
Mindst holdbar til:

**Pakend:**

8 kg ja 25 kg  
lisatud 100 ml mõõteanum

**Partii nr:**

Vt tootepakendilt  
Batch nr:

**Säilitamine:**

Kuivas ja jahedas