

# Leetrid on tõsine haigus


Leetrid on mitmete tüsistustega ohtlik nakkushaigus. Peale kokkupuudet leetrihaigega **nakatub sajast mittepõdenud ja vaksineerimata inimesest leetritesse kuni 98**. Sümptomid ilmnevad tavaliselt 10 kuni 12 päeva peale nakatumist ning meenutavad nii-nimetatud “külmetust” – tekivad nii palaviku tõus, halb enesetunne, köha, nohu kui silmasidekesta põletik. Silmad muutuvad punaseks ja valguse suhtes tundlikuks. Tavaliselt kolmandast seitsmenda päevani kestab palavik 39–41 °C ning kehale ilmub nädalaks punane lööve.

Ligi 30 % haigestunutest saab leetritest vähemalt ühe tüsistuse – eriti ohustatud on alla viieaastased lapsed ja üle kahekümneaastased täiskasvanud. Nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed põevad leetrid raskemalt.


## Leetrite põhjustatud tüsistused



Kuni 9 lapsel sajast esineb keskkõrvapõletik, mis võib päädida **kuulmiskaotusega**.




8 haigestunud sajast tekib **kõhulahtisus**.




Kuni 6% leetritesse haigestunutel tekib **kopsupõletik**. Kopsupõletik on laste puhul surmavaim leetrite tekitatud tüsistus.




Ühel tuhandest leetritesse haigestunutest tekib entsefaliit (**ajupõletik**). Ajupõletik võib tekitada krampe ja vaimset puuet.




**Silmakahjustused** - silma sarvkesta kahjustumine võib lõppeda nägemiskaotusega. Antud tüsistus puudutab eriti alatoidetud lapsi ja on seotud A-vitamiini puudusega.



Mitu aastat peale leetrite põdemist võib inimest tabada **surmav peaaju degeneratsioon** ehk alaäge skleroseeruv panentsefaliit (SSPE).



Iga neljas leetrihaige vajab **haiglaravi**.



Keskmiselt üks haigestunu tuhandest **sureb**.

