

Infoleht

Gastroskoopia

Mis on gastroskoopia?

Gastroskoopia on diagnostiline uuring, mille käigus arst vaatab painduva kaamera Teie söögitoru, magu ja kaksteistsõrmiksoolt. Kaamera viiakse soolestikku suu kaudu.

- Protseduur ei ole valus, kuid võib olla ebamugav, kaasuda võivad näiteks okserefleks või täiskõhutunne;
- Hingamist uuring ei sega;
- Uuring kestab tavaliselt kuni 15 minutit, lisanduvate koeproovide võtmisel ka kauem.

Miks gastroskoopiat tehakse?

Gastroskoopia abil saab avastada mitmeid haigusi (põletikud, haavandid, kasvaja, veenilaiendid ja soole valendiku ahenemised).

Uuringu käigus on võimalik diagnoosi täpsustamiseks võtta koeproove või teha raviprotseduure (nt verejooksu peatamine, polüüpide eemaldamine).

Kuidas uuringuks valmistuda?

- Oluline on tühi magu, vähemalt 6 tundi enne uuringut ei tohi süüa.
- Vett võib juua kuni 3 tundi enne sedatsiooniga protseduuri maksimaalselt 250 ml!
- Sedatsiooniga uuringul täpsustab raviskeemi anestezioloog või suunav arst.
- Vererõhuravimeid võib võtta vähese veega. Verd vedeldavate ja muude ravimite kasutamisest tuleb arstile kindlasti teada anda.
- Enne uuringut antakse Teile juua lahust, mis eemaldab maos mullikesi ja parandab protseduuri nähtavust.
- Kui Teil on eelnevalt olnud lidokaiini allergiat, andke sellest kindlasti teada!; protseduuri eelselt võidakse kurku tuimestada aerosooliga;
- Ehted ja proteesid soovime protseduuri ajaks eemaldada.

Kuidas protseduur kulgeb?

- Uuringu ajal lamate vasakul küljel;
- Suu vahel asetseb endoskoobi kaitseks plastikust huulik;
- Arst viib endoskoobi suu kaudu makku;
- Vajadusel võetakse soolestikust koeproove või eemaldatakse polüüpe;
- Kui kurku tuimestati või protseduur toimus sedatsioonis, ei tohi 1 tund pärast uuringut süüa ega juua;
- Eelistatult soovime peale protseduuri süüa ja juua jahedamat toitu ja jooki.

Sedatsioon

Gastroskoopiat soovime sedatsioonis ehk pindmises narkoosis:

- Teile manustatakse lühiajaliselt rahustavat ja uinutavat ravimit;
- Sedatsiooni ajal olete rahulikult pindmises unes ja hingate ise;
- Uuring on lokaalse tuimestusega võrreldes mugavam ja meeldivam;
- Pärast protseduuri jääte vähemalt üheks tunniks kliinikusse jälgimisele.

NB! 24 tunni jooksul peale pindmist narkoosi ei tohi Te autot juhtida, seetõttu soovime Teil protseduurile tulla koos saatjaga!

Võimalikud riskid

Protseduuri tüsistused on harvad, siiski võivad esineda allergia ravimitele, verejooks koeproovi või polüübi eemaldamisel (eriti eelnevate verd vedeldavate ravimite korral ning väga harva võib tekkida operatsiooni vajav mao seina kahjustus).

Tüsistused on harvad. Mõnikord võib esineda allergiat tuimestusele.

Toitumine enne gastroskoopiat

- **Keelatud** - kõik tahked toidud vähemalt 6 tundi enne protseduuri.
- **Lubatud** - vesi kuni 2 tundi enne protseduuri väikestes kogustes.

Tervishoiuteenuse osutaja

AS Medita | registrikood 12526983
tegevusloa nr L05340, L05341, L05342, L06480, L07209, L07210, L07211, L07215
telefon 17101 | medita@medita.ee | www.medita.ee